

くすりのしおり

内服剤

2019年01月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

製品名: デシコビ配合錠 HT

主成分: エムトリシタビン (Emtricitabine)

テノホビル アラフェナミドフマル酸塩 (Tenofovir alafenamide fumarate)

剤形: 青色の錠剤、直径約 12.7mm、短径約 6.5mm、厚さ約 4.4mm

シート記載など: (瓶ラベル記載) デシコビ配合錠 HT



この薬の作用と効果について

ヒト免疫不全ウイルス (HIV-1) の逆転写酵素の活性を阻害し、感染力のあるウイルスの増殖を抑えます。通常、本剤は、リトナビルまたはコビスタットを含まない他の抗 HIV 薬と併用し、HIV-1 感染症の治療に用いられます。

次のような方は注意が必要な場合があります。必ず担当の医師や薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬や食べ物で、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。B 型慢性肝炎、重度の腎障害がある。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（ : 医療担当者記入）
- ・通常、成人および 12 歳以上かつ体重 35kg 以上の小児は 1 回 1 錠を 1 日 1 回、必ずリトナビルまたはコビスタットを含まない他の抗 HIV 薬と併用して服用します。必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・飲み忘れた場合は、気がついたときにすぐ 1 回分を飲んでください。ただし、次の通常飲む時間に近いときは、忘れた分は飲まないで 1 回分をとばしてください。その後は指示された時間から薬の量を増やさずに 1 回分を飲んでください。絶対に 2 回分を一度に飲んではいけません。
- ・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

生活上の注意

- ・この薬は HIV-1 感染症の根治療法薬ではありません。薬を飲んでいても、病気が進行する可能性がありますので、身体状況の変化については全て医師に報告してください。
- ・セイヨウオトギリソウ（セント・ジョーンズ・ワート）含有食品は、薬の血中濃度を下げ、効果が減弱するおそれがあるので注意してください。

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、吐き気、下痢などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・むくみ、尿量減少、口渇 [腎不全、重度の腎機能障害]
- ・脱力感、疲労感、筋肉痛、息苦しさ [乳酸アシドーシス]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

- ・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。廃棄については受け取った薬局や医療機関に相談してください。

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、「患者向医薬品ガイド」、医療関係者向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。