

# くすりのしおり

内服剤

2018年05月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

**製品名: アイセントレス錠 400mg**

**主成分:**ラルテグラビルカリウム (Raltegravir potassium)

**剤形:**うすい赤色の錠剤、長径 15.9mm、短径 8.8mm

**シート記載など:**



**この薬の作用と効果について**

体の免疫機能を低下させ、日和見感染症などを引き起こすヒト免疫不全ウイルス（HIV）のインテグラーゼ（組込み酵素）を阻害して増殖を抑制し、抗ウイルス作用を示します。

通常、HIV 感染症の治療に用いられます。

**次のような方は注意が必要な場合があります。必ず担当の医師や薬剤師に伝えてください。**

- ・以前に薬や食べ物で、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

**用法・用量（この薬の使い方）**

- ・あなたの用法・用量は（ : 医療担当者記入）
- ・通常、成人は1回1錠（ラルテグラビルとして400mg）を1日2回、他の抗HIV剤と併用して服用します。食事の有無に係わらず服用できます。必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・飲み忘れた場合は、気がついた時、すぐに1回分を飲んでください。ただし、次の通常服用する時間が近い場合には飲まずに、次の通常の服用時間に1回分を飲んでください。絶対に、2回分を一度に飲んではいけません。
- ・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

**生活上の注意**

**この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）**

主な副作用として、吐き気、めまい、下痢、頭痛、不眠、異常な夢、疲労、体脂肪の再分布／蓄積（胸部・体幹部の脂肪増加、手足・顔面の脂肪減少）などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[ ]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・発熱、全身倦怠感、食欲不振、発疹 [皮膚粘膜眼症候群、薬剤性過敏症症候群]
- ・発熱、寒気、ふらふら感 [過敏症]
- ・手足の筋肉の痛み、こわばり [横紋筋融解症、ミオパチー]
- ・尿量減少、むくみ、頭痛 [腎不全]
- ・食欲不振、全身倦怠感、吐き気 [肝炎]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

**保管方法 その他**

- ・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。廃棄については受け取った薬局や医療機関に相談してください。

**医療担当者記入欄**

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、「患者向医薬品ガイド」、医療関係者向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。