全大腸カメラ(ニフレック用) 患者用クリニカルパス

ステーション

号室

様

日付	月日	月日			月 日 ~ 退院
ניו בו	検査前日	検査当日(検査前)	検査当日(検査後)		検査翌日
	恢 互削口		大腸カメラのみの方	ポリープを切除した方	ポリープを切除した方
説明 指導 教育	(検査時間は多少前後することがあります)	□処置を行うときは都度説明します。 □金属類・湿布・入れ歯は外してください。 □腹巻やコルセットは外してください。 □吐き気、腹痛、寒気など具合が悪くなったら、すぐ 看護師に知らせてください。	□検査後退院できます。(いつも通りの生活を送ってかまいません)□退院後の生活について説明いたします。□腹痛や便に血が混ざるなど、何かありましたらすぐにお知らせください。	□もう1日入院し、様子を見させていただきます。翌日まで腹痛や出血がなければ退院となります。 □退院後の生活について説明いたします。 □腹痛や便に血が混ざるなど、何かありま	口朝まで腹痛や出血がなければ退院となります。ただし採血がある方は、採血の結果で退院が決まります。
		□検査に行くとき、替えの下着を持参してください。 □医師の指示により必要時弾性ストッキングを はいて下さい。もしくはフットポンプを装着させて いただきます。		したらすぐにお知らせください。 ————	
	口薬は今まで通り内服してください。 ———		口すべての薬を再開してください。	口薬を再開してください、	口薬は今まで通り内服してください。
投薬		口ポリープを切除する予定の方は検査に行く少し前より、	□食事開始時より糖尿病の薬・インスリン	(あらかじめ中止の指示があるものは飲まな	(あらかじめ中止の指示があるものは飲まな
注射	ください) 口糖尿病の薬・インスリン注射は中止して	点滴を行う場合があります。 	注射を再開してください。 	いでください) 口糖尿病の薬・インスリン注射は中止してく	いでください。開始日については退院前に 看護師より説明いたします)
71/11	ください。			ださい。	□食事開始時より糖尿病の薬・インスリン
	□今飲んでいる薬を見せていただきます。	·		口点滴を行います。	注射を再開してください。
	□医師の指示がある方は、採血などの検査を	□朝6時から腸管洗浄剤を飲みます。		□糖尿病の方のみ、朝・昼・夕に血糖の	
処置	します。	ロニフレックの方		検査を行います。	
検査	口 <mark>夜7時に下剤300mLを飲みます。</mark>	・2時間かけて飲んでください。		(値によって必要であれば、インスリン注射	
	(一気に飲んでも、ゆっくり飲んでもかまい	・15分でコップ1杯飲む程度で飲んでください。		を行います)	
	ません)	・便が出始めたら、流さずに看護師へ知らせて			
		ください。			
		ロビジクリア錠()錠の方 別紙参照			
		・便が出始めたら、流さずに看護師へ知らせて			
	┃ ┃□糖尿病の方のみ、朝・昼・夕に血糖の検査を─	ください。			
		 □下剤を飲んでも便がきれいにならなければ、			
	110.657。 (値によって必要であれば、インスリン注射を	医師の指示で浣腸などの追加処置をする場合が			
	行います)	あります。			
		□検査に行く前に、検査用の紙パンツを履いていただき			
		ます。			
A +		口食事は食べられません。	□検査後食事を摂取してかまいません。	口本日は飲水のみで、絶食となります。	□朝まで腹痛や出血がなければ、食事開始
食事 栄養	□検査食以外食べられません。 □21時以降何も食べられません。	□下剤を飲み始めるまで、水は飲めます。		(腹痛や出血がなければ、翌朝から食事 開始となります)	となります。
×14.00	□ <mark>Z 「 </mark>			http://よりみり/	
 安静	口安静に制限はありません。	 □安静に制限はありません。	 □安静に制限はありません。	 □なるべく安静にし、移動は病棟内のみと	□安静に制限はありません。
清潔管理		口体を拭きに行きます。	口入浴できます。	してください。	口入浴できます。
毎日 あむ	口検温をします。				
観察	口症状など聞きに行きます。 ―――――				